

HERRAMIENTAS PARA UN CULTIVO SIN MALAS HIERBAS

	NOMBRE COMERCIAL	COMPOSICIÓN	FORM.	OBJETIVO	DOSIS*
HERBICIDAS	BETASANA ® SC	Fenmedifam 16% p/v (160 g/l)	SC	Dicotiledóneas	6 l/ha
	BETASANA TRI ®	Desmedifam 1,5% + Etofumesato 11,5% + Fenmedifam 7,5%	SC	Malas hierbas anuales	4 l/ha
	BETTIX ® FLO	Metamitrona 70% p/v (700 g/l)	SC	Malas hierbas anuales	7 l/ha
	ETHOFOL ® 500SC	Etofumesato 50% p/v (500 g/L)	SC	Dicotiledóneas	1 l/ha
	OBLIX ® MT	Etofumesato 15% + Metamitrona 35%	SC	Malas hierbas anuales	6 l/ha
FUNGICIDAS	MICROTHIOL ® SPECIAL DISPERSS®	Azufre 80% p/p (800 g/kg)	WG	Oídio	0,2-0,5 %
	MITRUS ®	Miclobutanil 12,5% p/v (125g/l)	EC	Oídio	0,5 l/ha
	VONDOZEB ® GD	Mancozeb 75% p/p (750 g/kg)	WG	Cercospora, Roya	3-4 kg/ha
INSECTICIDAS	CEKUMETRIN ® 10 EC	Cipermetrin 10% p/v (100 g/l)	EC	Orugas, Pulgones	0,05-0,1%
	PANDA ® 48 LE	Clorpirifos 48% p/v (480 g/l)	EC	Cásida, Mosca, Pulgones	150-200 cc/ha
OTROS	CEKU-HUMECTANTE ®	Tensioactivo no iónico 20% p/v (200 g/l)	SL	Coadyuvante	Hasta 0,3 %

DOSIS*: Dosis de herbicida: Dosis máxima por ciclo de cultivo. Dosis de insecticidas/fungicidas: Dosis por aplicación.

ABREVIATURAS

FORM. = Formulaciones:

SC: Suspensión concentrada. • **WG:** Granulado dispersable en agua.

EC: Concentrado emulsionable. • **DP:** Polvo para espolvoreo.

SL: Concentrado soluble.



Formulación **DISPERSS**®.

©: Marca Registrada

USE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS DE MANERA SEGURA. LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE USARLO.

Distribuido por:

HERRAMIENTAS PARA EL MEJOR CULTIVO DE REMOLACHA



PROPUESTA DE CONTROL DE MALAS HIERBAS, ENFERMEDADES Y PLAGAS

Umbrales o momentos de aplicación:

Siembra

Tratamiento »

T1

T2

T3

MALAS HIERBAS

Pre-emergencia
BETTIX FLO+
ETHOFOL 500SC
 o **OBLIX** MT
 o **OBLIX** MT + cloridazona
 + Aceite si es necesario

(Máx. siembra + 2-3 semanas)
BETASANA TRI®
 + **BETTIX** FLO
 + Aceite si es necesario

(T1 + 8 días, en función
 de la emergencia
 de las malas hierbas)
BETASANA TRI®
 + **BETTIX** FLO
 + Aceite si es necesario

(T2 + 8 días, en función
 de la emergencia
 de las malas hierbas)
BETTIX FLO+
ETHOFOL 500SC+
BETASANA SC o
OBLIX MT+
BETASANA SC o mezclas
 que contengan desmedifam
 + Aceite si es necesario

PARAR la aplicación
 del herbicida
 cuando se haya
 cubierto el 70%
 del suelo

ENFERMEDADES

OÍDIO (Primera mancha en lines. Presencia de nuevo micelio)

CERCOSPORA (1ª aplicación 10% de hojas sintomáticas en cultivos que superen las diez hojas verdaderas, aplicaciones sucesivas espaciadas 21 días)

CÁSIDA (50 huevos + 50 larvas/50 hojas, 100 adultos/50 plantas)

ORUGAS (Remolacha en cotiledones: 2 larvas pequeñas o planta muerta/50 pl. Primavera: 50 L1-L2/50 plantas. Verano: 150 L1-L2/50 plantas)

PULGONES 5 colonias pequeñas (25-50 pulgones) / 50 plantas

MICROTHIOL® SPECIAL DISPERS®

VONDOZEB® GD

PANDA® 48 LE

CEKUMETRIN® 10 EC • **PANDA**® 48 LE

CEKUMETRIN® 10 EC



ABREVIATURAS

FORM. = Formulaciones:
 SC: Suspensión concentrada. • WG: Granulado dispersable en agua.
 EC: Concentrado emulsionable. • DP: Polvo para espolvoreo.
 SL: Concentrado soluble.

